


Hőmérsékleti sugárzás



Minden test (legyen bármekkora is a hőmérséklete) környezetének hőfokától függetlenül sugároz.
Elektromágneses sugárzást bocsát ki.

Hogyan jellemezzük?

$$E_{\ddot{o}} = E_a + E_r + E_t , \quad 1 = \frac{E_a}{E_{\ddot{o}}} + \frac{E_r}{E_{\ddot{o}}} + \frac{E_t}{E_{\ddot{o}}} \quad (J/J_0)$$

$\alpha(\lambda, T)$ abszorpcióképesség (függ a test sajátosságaitól is)

$M(\lambda, T)$ emisszióképesség vagy másképpen kisugárzott felületi teljesítmény



Kirchhoff törvény (vigyázat)

$$M/\alpha = \text{\'all.} = M_{\text{fekete}}(\lambda, T)$$

abszolút fekete test

$$\alpha = 1$$

1473 K-en 11,7-szer több M , mint 798 K-en (Tyndall)

$$\left(\frac{1473}{798}\right)^4 = 11,61$$

Stefan–Boltzmann-törvény

$$M_{\text{teljes}}(T) = \sigma T^4$$

$$M_{\text{fekete}}(T)$$

Stefan- Boltzmann állandó

$$\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \left[\frac{W}{m^2 K^4} \right]$$

Wien-féle eltolódási törvény:

$$\lambda_{\max} T = \text{áll.}$$

$$\text{vagy } f_{\max}/T = \text{áll.}$$

Milyen a spektruma? (Wien)

$$\frac{\Delta M}{\Delta f} = af^3 e^{-\frac{bf}{T}}$$



(a, b paraméterek)

Max Planck (1858-1947)




$$\frac{\Delta M}{\Delta f} = a' f^3 \frac{1}{e^{\frac{b' f}{T}} - 1}$$





(a', b' paraméterek)

a klasszikus fizika vége 1900





Alkalmazás: termográfia, Infradiagnosztika





Love Your Heart... Prevent Heart Disease

**Heart disease and strokes are PREVENTABLE, but only if you
KNOW before it's too late**





Köszönöm a figyelmet!