



Membrán mikrodomének, mikrovezikulák, membrán nanocsövek és szerepük a sejtfunkciókban



SE Biofizika, Matkó János-ELTE, Immunológia

- A sejtmembrán ultrastruktúrája
- A membrán mikrodomének (lipid tutajok, caveolák), avagy a lipidek és fehérjék „társasélete”
- Egyéb membránstruktúrák (membrán mikrovezikulák és membrán nanocsövek) szerepe a sejt kommunikációban: példák az immunrendszer életéből

A membránfehérjék globális szerkezete és kapcsolódása a lipid kettősréteghez:




Homogén-e a membrán lipid kettősréteg?

- Lipid mikroheterogenitás többkomponensű mono- és bilayerekben, liposzómákban (LUV): mikrokolorimetria, FRAP, ESR
- Spontán **GSL**, **SM** szegregáció két/háromkomponensű PC lipid kettősrétegben
- A **koleszterin** egy kritikus stabilizáló faktor


Gal-cer

PC



E. London, 2002.

Fluid (zöld) és gél fázisú (piros) lipid domének kétkomponensű liposzóma modellmembránban (SNOM, Kinnunen, 2002)





A „Caveola mikrodomének” elektronmikroszkópiás képe




Fibroblaszt sejtek fagyasztva tört belső membránfelszínének elektronmikroszkópos képe


A „caveola” membrán mikrodomének szerkezete



A 'GSL domének' stabilitása membránokban: kiterjedt H-híd hálózat



A membrán mikrodomének „detergens-rezisztensek”




-"erős"/ ionos detergenssek:
pl. oktil-glikozid, SDS

kioldás /szolubilizáció/


-"gyenge"/nem ionos
detergenssek:
pl. Triton X-100, CHAPS, NP-40,
Brij 97, Lubrol

Részleges vagy teljes rezisztencia



A lipid „tutajok” (raftok)
kémiai definíciója

A sejtmembrán lipid raft dinamikájának modellje




"tutajozó fehérjék":

- GPI-horgonyzott (EC oldal)
- acilált (dupla palmitoilált, mirisztóilált, prenilált stb.) (IC oldal)
- transzmembrán fehérjék (ED, TRMD, CPD)

A „tetraspan web”: TM4-SF fehérjék hálózata a membránban

- 34 tetraspan fehérje ismert emlősökben, ebből 33 humán is
- Képesek „konformációs pányvázóként” (scaffolding) többféle fehérje szelektív horgonyzására a membrán egy területén. A kapcsolódó fehérjékkel nagyobb, több száz fehérjéből álló 'hálózatot' is tudnak képezni a membránban



„TEM domének”




Fig. 11. Tetraspan microdomains and lipid rafts differ in their lipid-protein content. Schematic representation of which class II-peptide complex is enriched in tetraspan or lipid raft microdomains.






Fig. 12. CD3/ERM1 microdomains are involved in vesicle formation between DCs and T-helper cells. Monoclonal anti-CD3 was used to label CD3 molecules, and anti-ERM1 was used to label ERM1. The cells were stained for CD3/ERM1 (green) and for CD3 (red) with the anti-CD3 (red) (green), or shown in the upper panel (red). The lower panel of images shows the colocalization of the two proteins according to the DC-T cell synapse (200 nm).

A kortikális szkeleton és a membránfehérjék kapcsolatrendszer a sejtmembránban: a "kerítés" modell



Az ERM fehérjecsald és a citoskeletális kapcsolatok



A plazmamembrán jelentős laterális és vertikális heterogenitást, „mikrodomén szerkezetet” mutat eukaryóta sejtekben

A biológiai membránok finomszerkezete


- mikroheterogenitás: membrán mikrodomének (20 nm-akár $\sim \mu\text{m}$ átmérő), dinamikus, tranzien্স molekulacsoportosulások (specifikus lipid és fehérjeösszetétel)
- lipid-lipid és fehérje-lipid kölcsönhatások, fehérje konformáció és TRMD (transzmembrán hélix)-hossz *dominál* a lipid raft doméneken belül
- fehérje-fehérje kölcsönhatásokon alapuló mikrodomének is vannak, mint pl. „Tetraspan-web” (TEM)

A membrán mikrodomének funkcionális jelentősége:


- Jelátvitel, sejt-kommunikáció „térbeli és időbeli” kontrollja (immunrendszer, idegrendszer)
- Különböféle mikróbák (vírusok, prionok, baktériumok, protozoák) transzportja sejtekbe/sejtek között

Lipid raftok és a limfocita jelátvitel

- kompartmentalizáció: „toborzás/kapcsolás”
- izolálás, kinetikai szabályozás
- szignál integrálás (PI3-K/Vav/Rac; raft-aggregáció, receptor clustering)
- fehérje szelekció/szortírozás




A membrán mikrodomének különféle mikróbak célpontjai



A raftok szerepe az allergén-válasz kialakulásában

(RBL-2H3 mucosa hízósejtek/leukocyták)




A HIV és egyéb vírusok (pl. kanyaró, influenza és himlővírusok) célsejtbe jutása: „raft-függő” folyamat


➤ A vírus sejtfelszínhez történő kapcsolódása, rögzülése, a membránfúzió és internalizáció:

- függ a vírusreceptor(ok) raft-lokalizációjától
- koleszterinfüggő
- függ a kortikális citoskeleton és a raftok integritásától


A HIV-1 fertőzés molekuláris modellje




T sejtek, monociták, DC fertőzése HIV vírussal




A T-sejt - APC immunuszinapszis: funkcionális modell




Tolerancia ill. immunválasz (priming) indukciója egérben antigén-targeting révén – a nyirokcsomó 2PM „in vivo” dinamikus képződése





A membrán nanocsövek kialakulása, típusai


- a.) F-aktin/tubulin tartalmú „protrúzió” képződése és növekedése révén
b.) Két előzőleg kontaktusban levő sejt eltávolodásakor (pl. osztódás után)



D.M Davis, S. Sowinski: *Nature Rev Mol Cell Biol* 9:431, 2008.


A T-sejtek közötti „nanocsövecskék hálózata”

Sowinski et al, 2008, *Nature Cell Biol*



- A nanocsövek kontaktusba lépő (in vitro: 12-15 óra) fertőzött és nem fertőzött T sejtek kapcsolatának megszűnése után alakulnak ki
- A T sejt nanocsövek, szemben mieloid nanocsövekkel, nem mikrotubulus hanem F-aktin-tartalmú membránnyúlványok
- A T-sejt nanocsövek nem „nyitott végű csatornák”, anyagtranszport nincs


„Baktérium szörfőzés” a makrofágok között



Mycobacterium bovis bacillus Calmette-Guérin (BCG)⁴ expressing GFP.


Önfelt et al, *J Immunol* 2006. 177: 8476-83

Tunelling nanocsövek (TNT): anyagtranszport, vezikulattranszport, hálózatok...




Intercelluláris transzport a „tunneling nanocsöveken” át:

- lipid vezikulák
- membrán részek
- endoszóma, lizoszóma
- mitokondrium, miRNA
- aktív kaspáz-3, endogén membrán kötött FasL
- receptorok (CD59, CD81, MHC-I)
- prionok



Szekretált membrán mikrovezikulák: a sejtek „távkommunikációs eszközei”



A membrán mikrovezikulák exoszómák szabályozó funkciói: példák az immunszabályozásra

