

MRT

(Radiospektroskopische Methoden)

Radiowellen haben eine geringe Photonenenergie, wesentlich weniger als 1eV -> keine chemische Veränderungen möglich!

Schay G.

Grundlagen:

NMR : Nuclear magnetic resonance
(kernmagnetische Resonanz)

ESR : electron spin resonance
(Elektronenspinresonanz)

Mikrowellenspektroskopie (Stoffanalyse)


Anwendungen:





MRT/MRI (magnetische Resonanztomographie / Resonanzbildgebung)

NMR (MRI) und ESR sind beide magnetische Erscheinungen
Also wir brauchen Einiges aus Magnetismuslehre.

Magnetische Polen

n.B: es gibt keine magnetische Monopolen
(also Süd oder Nordpol alleine) nur Dipole sind
möglich. Eine bewegende (beschleunigte)
Ladung produziert ein Magnetfeld.






$$\Delta E = E_{\max} - E_{\min}$$

Hängt von der Feldstärke ab!

$$\Delta E = 2 \cdot \mu \cdot B_0$$




Kern und electron spin



„Spin“ ist ein Spielzeug: Kreisel


Kreiselbewegung kommt zu stande, wenn das Drehmoment durch eine äußere Kraft verändert wird.




Drehimpulserhaltungssatz:
„Falls das Drehmoment (τ) null ist, dann bleibt der Drehimpuls (L) konstant.“

$$\frac{\Delta L}{\Delta t} = \tau$$

Alle sind Vektoren!





Kreisel, und Kreiselbewegung



Kreisel


Ein Drehmoment kommt durch die zwei Kräfte (Gravitation, und Unterstützung) zu stande. Das ergibt eine Veränderung des Drehimpulses, welche aber senkrecht zu dem Drehimpuls selber entsteht.



ω_p : Larmor Frequenz,
Kreisfrequenz der Kreiselbewegung

$$\omega_p = \frac{x \cdot mg}{I \cdot \omega}$$

Elektromagnetismus




Ein Draht mit Strom produziert ein Magnetfeld

$$\sum_{l=0} \mathbf{B} \cdot \Delta \mathbf{l} = \mu_0 I$$


Ampère - Gesetz

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \text{ Permeabilität}$$

Elektromagnete benutzen mehrere Schleifen




Eine Schleife



Eine Stromschleife besitzt auch ein magnetisches Moment



$$\mu = IA$$

$A = \text{area}$




Auch ein einziges Elektron...

Aber, das ist nicht alles,
Kernteilchen und Elektronen
haben auch noch ein Spin.



Stern-Gerlach Experiment:
In einem inhomogenen Feld hat man zwei Richtungen beobachtet.

Erklärung: an einem Dipol wirkt ein netto Kraft in dem anisotropischen Feld.



ZWEI Wege -> ZWEI Einstellungen

(sonst hätten wir in alle Richtungen
atome gesehen)


Die Einstellung ist quantisiert.

Dieser „extra“ magnetischer Moment nennt man Spin
(benimmt sich auch wie ein Kreisel)

$$\mu = \hbar \cdot \gamma \cdot s$$

Gyromagnetischer Faktor


$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$




$$\gamma = g \cdot \frac{q}{2m}$$

Ladung

Zeemansche Aufspaltung



Präzession




Protonen- (und electronen-) Spine haben einen Spinquantenzahl $m_s = 1/2$
also es sind zwei Energiewerte möglich

$$\Delta E = 2\mu B_0 = \gamma \cdot \hbar \cdot B_0$$

$$\mu = \hbar \cdot \gamma \cdot \left(\pm \frac{1}{2}\right)$$

$$\gamma = g \cdot \frac{q}{2m}$$

$$\Delta E = 2 \cdot \left(\hbar \cdot g \cdot \frac{q}{2m} \cdot \frac{1}{2} \right) \cdot B_0 = g \cdot \left(\frac{q \cdot \hbar}{4\pi \cdot m} \right) \cdot B_0 = g \cdot \mu_N \cdot B_0 = g_P \cdot \mu_N \cdot H$$



μ_N : Bohr Magneton, hier $q=e$, $m=m_{\text{proton}}$

Ein Beispiel:

$$\Delta E = g_P \cdot \mu_N \cdot H$$

Falls $H = 3T$ dann:

- Wie groß ist der Energiedifferenz? $g_P = 5.59$; $\mu_N = 5.05 \cdot 10^{-27} \frac{J}{T}$
- Die benötigte Photonenenergie in eV
- Frequenz
- Verhältniss von erregte/grundzustands Protonen
- aus 5000000 Protonen, wie viele werden in dem erregten Zustand sein?

$$\Delta E = 5.59 \cdot 5.05 \cdot 10^{-27} \frac{J}{T} \cdot 3T = 8.469 \cdot 10^{-26} J = 5.29 \cdot 10^{-7} eV$$

$$n.B. : kT \text{ at } 25^\circ C \text{ is } 1.38 \cdot 10^{-23} J/K \cdot (273+25)K = 4.11 \cdot 10^{-21} J$$


$$\text{Also } \Delta E/kT = 2.06 \cdot 10^{-5} = 0.0000206$$

Viel kleiner als die thermische Energie!

$$f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{8.469 \cdot 10^{-26} J}{6.63 \cdot 10^{-34} Js} = 1.27 \cdot 10^8 \frac{1}{s} = 127 MHz$$

Radiofrequenz, genauso wie Musik – FM Radiosender

$$\frac{N_{\text{erregt}}}{N_{\text{grundzustand}}} = e^{-\frac{\Delta E}{kT}} = e^{-2.06 \cdot 10^{-5}} = 0.9999794002$$



Auch bei sehr große Feldstärken ist der Unterschied klein: (Erde: 20-70 μT)

$$N_{\text{grundzustand}} - N_{\text{er}} = 102$$

Bei NMR messen wir eigentlich nur diese „unterschiedsprotonen“ da die anderen sich gegenseitig ausgleichen

Für Kernspinresonanzverfahren geeignete Kerne

Die Kerne mit ungepaarter Protonen- oder Neutronenzahl

^1H , ^2H , ^3H , ^3He , ^6Li , ^{10}B , ^{13}C , ^{14}N , ^{15}N , ^{19}F , ^{23}Na , ^{31}P ...

Meistens verwendete Kerne ($s = 1/2$)

Die Zusatzspine sind im Gleichgewicht parallel mit dem Magnetfeld. Mit RF Photonen können die erregt werden in die antiparallele Einstellung.



Ein Photon wird einen Spin erregen. Die Photonendichte, und Einwirkungsdauer bestimmen den Erregungsgrad (%).
Nach Erregung folgt ein exponentielles Abklingen.





Es gibt aber auch die Kreiselbewegung
 $\omega_p = 2\pi f_{\text{Larmor}}$

$$\hbar \cdot f_{\text{Larmor}} = \Delta E$$


Die Präzession hat eine Phase und eine Frequenz.

Beide hängen von der Feldstärke ab.







$H = H_0(1 - \sigma)$, die Elektronen schirmen das Magnetfeld etwas ab.
Das ist aber sehr empfindlich!




90° pulse: nur ½ der zusätzSpine werden erregt (Pulsdauer und Photonendichte!)





Dann ist aber die z-Magnetisierung 0, und in der xy Ebene ist die Magnetisierung maximal











Exp. Abklingen, aber die Rate hängt von der lokalen Magnetfeldstärke ab.
Das wird von der Umgebungsmaterial ("Gitter") beeinflusst:
Spin-Gitter Relaxation: T1




In der x-y Ebene ALLE spine können beitragen.
Die einzelnen Spine werden synchronisiert während des RF-Impulses, aber danach wegen lokale Inhomogenitäten ($T_2 \rightarrow T_2^*$) und zufällige Schwankungen (wegen Felder naheliegenden Spine) die Dephasierung fängt an. (**spin-spin relaxation: T2***)








Phasenkodierung: durch ein kurzfristiges Gradient wird Frequenz etwas verändert, was eine Phasenverschiebung verursacht.
Nach der Gradientenpulswirkung haben wir die unterschiedlichen Protonen mit unterschiedlicher Phase, was ein gemischtes Signal produziert. (was aber später wieder zerlegbar ist)




Frequenzkodierung: wieder mit Gradienten möglich.



- 1: SSG Schichtauswahl
- 2: Phasenkodierung, das muss man mehrmals wiederholen mit unterschiedlichen Gradienten
- 3: Frequenzkodierung


1+2+3 = x,y,z Richtungen:
3D Bildgebung.




Man muss das ganze Prozess mehrmals wiederholen : lange Aufnahmezeiten!

Echo planar imaging:
Man kann mehrere echo-impulse benutzen, das macht es etwas schneller


(Gehirnaufnahmen)




3 messbare Parameter -> es ist praktisch immer möglich ein kontrastreiches Bild zu bekommen





Gd: Gadolinium, (paramagnetisch)
T1 relaxation wird kürzer, das kann man als Kontrastmittel benutzen. (ist leider giftig, und muss im Komplexform benutzt werden)




Gd-Kontrast



Diffusionsgewichtetes Bild
(Diffusionstensorbilgebung)





Tracking fibers in the white matter by constrained diffusion



fMRI: functional MRI.

Gehirnaktivität \leftrightarrow Durchblutung.

BOLD: Blood Oxygen Level Dependent.

Deoxyhemoglobin is paramagnetisch, Oxyhemoglobin is diamagnetisch

T2* wird verkürzt wegen erhöhte Durchblutung.




Ergänzungsmaterial!

EPR/ESR: Electron spin resonance


Electrons have spins, and spin+orbital magnetic moments.

The magnetic moment is larger -> GHz frequency photons are required.

Due to technical difficulties most EPR machines are not FT, but cw.
Moreover, often the GHz frequency source is fixed-frequency, and the magnetic field is varied.




Ergänzungsmaterial!



Ergänzungsmaterial!


Splitting of the spectrum occurs due to hyperfine interaction:
The electron spin interacts with the spin of it's own nucleus, or even of a neighbouring nucleus (super hyperfine splitting)



Chemistry and environment sensitive!

Ergänzungsmaterial!

Microwave spectroscopy: rotational excitation.



Ergänzungsmaterial!

