



Strahlentherapie

Strahlentherapie: Anwendung der schädigende Wirkung der ionisierenden Strahlungen für Zerstörung der (hauptsächtlich Tumor-) Geweben.

Fragen zu besprechen:

1. Welcher Strahlungstyp soll angewendet werden?
2. Welche Dosis anzuwenden?
3. Wie kann diese Strahlung hergestellt werden?
4. Wie kann die Strahlung das Zielorgan erreichen (so daß die andere Gewebe nicht beschädigen)?

1. Art der Strahlung

α , β , e^- , γ , Rtg, n, p

Elektron

Photon

α : Kleine Reichweite (in Geweben $\approx \mu\text{m}$)

Direkt in das Tumorgewebe eingegebene α -strahlendes Isotop (zB. zum Antikörper gebunden)

β^- , beschleunigtes e^- : beide sind Elektronen, aber:


Kontinuierliche Energieverteilung mit gleicher und leicht kontrollierbarer Energie
 E_{max} hängt von Isotopart

β^- beschleunigtes e^-

Typische Energie einige MeV (zu niedrig) 10-20 MeV

Herstellung der Elektronenstrahlung:


- Betatron
- Linearbeschleuniger



6-21 MeV \Rightarrow 2-7 cm Tumoren nahe der Körperoberfläche

γ -Strahlung und Röntgenstrahlung

ihre Herstellungen und Spektren sind unterschiedlich!




Ort der Photonabsorption

\neq


Ort der Strahlenschädigung!

Strahlenschädigung: Ionisation \Rightarrow unerwünschte Ionen \Rightarrow schädigende biochemische Prozesse
 \Rightarrow Ort der Strahlenschädigung = Ort der Ionisation




Körperoberfläche

Gewebe



Relative Tiefendosis



γ -strahlendes Isotop: zB. ^{60}Co $E_\gamma \approx \text{MeV}$,
typisch angewendete Aktivität: TBq

Hochenergetische Röntgenstrahlung

Herstellung:


Abbremsung der beschleunigten Elektronen in einem Anodematerial (Target).

Wie in einem Röntgenröhre, aber die Beschleunigung wird in mehreren Schritten mit einem speziellen Gerät (zB. Linearbeschleuniger) durchgeführt.

Protonenstrahlung

Ideal, aber sehr teuer

Teilchenschleuniger => variierbare Teilchenenergie
mehrere 100 MeV => Eindringtiefe ~ 10-20 cm




2. Dosis:

10x der Dosis was bei einer Ganzkörperbestrahlung tödlich wäre.

Aber: - Lokalisiert!

-Fraktionierung

- Die schnell wachsende Gewebe sind empfindlicher gegen Strahlenschädigung.



3. Herstellung der Strahlungen

e^- : Linearbeschleuniger


Rtg: Elektronenbeschleuniger + Anode

Proton: Teilchenbeschleuniger (Zyklotron)



Linearbeschleuniger

Zyklotron


4. Wie kann die Strahlung das Zielorgan erreichen?




Teletherapie



Statt Umdrehung von einer Strahlenquelle: viele Strahlenquellen (Isotope) strahlen gleichzeitig aus unterschiedlichen Richtungen auf ein kleines Zielvolumen: **Gamma-Messer (Gamma Knife)**





Gamma-Messer (Gamma-Knife):

200 Isotope
Gesamtaktivität ~100 TBq

Nur der Patient wird bewegt (mit Bett)
Schießen mit mm Genauigkeit.


Enwickelt für Gehirntumoren

Kontakttherapie (Brachytherapie)

$$D \sim J \sim \frac{1}{r^2}$$

Das Isotop wird in den Körper mit Fernsteuerung eingeschickt.

(after loading)



Brachytherapie mit Isotopimplantate

- Prostata
- ^{125}I
 $T_{1/2}=60\text{Tage}$
Photonen-
energie=35 keV

